

# SFATURI DE CULTURA

## Crizantema Multiflora



Crizantemele din seria Multiflora se pot cultiva in aer liber in conditii naturale cat si controlat in sera sau solar. De regula se planteaza in ghivece mari, pentru a obtine o planta matura foarte mare, dar se pot cultiva si in ghivece de 12 cm.

**Plantarea:** pentru a se obtine plante mari in ghivece de 18-20 cm se va incepe cultura intre mijlocul lui Aprilie si mijlocul lui Iunie. Cine va incepe cultura pana la mijlocul lunii Mai va planta doar cate un butas pe ghiveci, dupa mijlocul lui mai se recomanda plantarea a 2-3 butasi per ghiveci. Pentru a obtine plante mature de marime mijlocie se vor planta butasi abia in Iunie, in ghivece de 12-14 cm

**Substrat:** se recomanda folosirea substratelor de turba imbunatatite cu ingrasamant de lunga durata (2kg/metru cu) cat si amestecate cu argila sau perlite, pentru cine vrea sa economiseasca...chiar si pamant de gradina desinfectat. **NU SE VOR CULTIVA IN TURBA GOALA!!!**...deoarece acest lucru creeaza greutatea la udarea plantelor pe perioada verii, care duce la plante dezvoltate inegal.

**Ciupirea:** Cu toate ca aceste varietati de crizanteme au o ramificare naturala foarte buna se recomanda 2 ciupiri la ghivecele mari si una la ghivecele mici. Se va ciupii foarte usor varful (pensare). Ultima data la care se va efectua ciupirea este 15 Iulie, la varietatile cu crestere mare se poate ciupii pana la 25 Iulie.

- Ciupirea:** la culturile de camp incepute in sera se recomanda ciupirea atata timp cat planta inca este in sera. Prin ciupire se poate prelungii sau scurta inflorirea cu 10 zile. La soiurile timpurii se va ciupii putin mai jos decat la soiurile mijlocii si tarzii!!!
- Retardanti:** la cultura de camp este nevoie de retardanti doar la soiurile timpurii, in special in perioada cand noptiile sunt foarte calde. Se va aplica Cycocel in amestec cu Caramba.
- Udarea :** Crizantema are nevoie de foarte multa apa si substante nutritive. Ingrasamantul de lunga durata din substrat nu este de ajuns pentru o buna crestere. De asemenea substratul nu are voie sa se usuce. In cazuri contrare va duce la o planta inegala si de calitate slaba. Se va administra ingrasamant la fiecare udare, se va incepe cu 0,1% apoi se creste treptat pana la 0,3%. La inceputul culturii se va administra un ingrasamant cu continut mare de azot (N)- Flory 3 Mega (18-12-18) apoi se va administra Flory 2 Mega (16-6-26). De recomandat este udarea prin picurator si dozarea ingrasamantului cu DOSATRON.
- Bolile:** Se va avea grija in perioadele ploioase si dupa 15 septembrie la aparitia Ruginii Albe. In aceste perioade se recomanda tratamentul preventiv.

