

SFATURI DE CULTURA

Nemesia seria "Sunsatia"

Nemesia Seria **Sunsatia**



*Sunsatia® Blackberry**
Sunsatia® Snowberry
*Sunsatia® Cassis**
*Sunsatia® Saffron**
*Sunsatia® Impr. Mango**
*Sunsatia® Kumquat**
*Sunsatia® Maranon**
*Sunsatia® Coconut**
*Sunsatia® Tamarillo**
*Sunsatia® Carambola**
*Sunsatia® Watermelon**

Descriere: Nemesia seria Sunsatia este oferita ca si planta curgatoare sau cu cresterea dreapta. Este ideala pentru cultura in vase suspendate , jardiniere, rondouri si se preteaza bine in combinatii cu alte plante. Se preteaza perfect pentru plin soare!!!

Plantarea: in ghivece de 11-12 cm; 25-40 plante/mp, in saptamaniile 6-12 vanzare in container de 17 cm sau suspendate de 20-25 cm; 8-9 plante/mp, dar se recomanda plantarea a 3 plante / 25 cm

Substrat: se va folosii un subsrat Tipp 2, si se va adauga Perlite si Fier. Atentie deosebita la drenajul in substrat, planta nu are voie sa stea uda.

Ingrasamant: nevoie medie de ingrasamant, dar are nevoie de Fier, de aceea se recomanda adaugarea de Fe in substrat la nevoie (Sequestel sau Optifer) . Ingrasamantul se va aplica saptamanal 0,2%. NPK 15-10-15



greenhouseplant srl

Str. Republicii Nr.89
337345 Pui
Mobil +40722373092
Telefon +40254779191
info@greenhouseplant.eu
www.greenhouseplant.eu

- Temperatura:** La inceput 16 grade, dupa circa 2-3 saptamani se poate scadea la 10-12 grade. Este posibil si o temperatura de 10 grade de la inceputul culturii, aceasta insa duce la o inflorire intarziata cu circa 3 saptamani (aceasta cultura la rece are ca rezultat plante mai frumoase)
- Lumina:** se va cultiva in plina lumina, fara umbrire, umbrirea duce la foarte putine flori
- Inflorirea::** planta infloreste la 6-8 saptamani dupa plantare, de exemplu la o plantare la mijlocul lui februarie infloreste la mijlocul lui aprilie
- Retardanti** Tilt 0,025-0,05% sau Topflor 0,05%
- Ciupirea:** se va efectua la o saptamana dupa plantare, sau in cazul unor butasi mari se ciupeste odata cu plantarea. Ciupiri sau toaletari se pot efectua pe tot parcursul culturii
- Boli/daunatori:** se recomanda un tratament preventiv cu Fungicide, se va avea grija pe timpul culturii la Thrips deoarece toate nemesia sunt sensibile la virusul Taspo. Urmatoarele substante sunt foarte efective la Nemesia: Baymat, Confidor, Conserve, Previcur N, Euparen, Rovral, Vermitec. Atentie la utilizarea substantei Switch, duce la daune pe tulpina si frunza. Atentie deosebita la igiena in sera!!!!